

## Литература

1. Черкас Л. А. *Функция Дюлака полиномиальных автономных систем на плоскости* // Дифференц. уравнения. 1997. Т. 33, № 5. С. 689–699.

2. Гринь А. А. *Функция Дюлака-Черкаса в окрестности неустойчивого фокуса полиномиальных автономных систем на плоскости* // Дифференц. уравнения. 2014. Т. 50, № 1. С. 3–9.

## ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО МАТРИЧНОГО УРАВНЕНИЯ ЛЯПУНОВА С ПАРАМЕТРОМ

Л.А. Данилович

Белорусско-Российский университет, Могилев, Беларусь

В работе [1] на основе применения метода [2, гл. 2] получены коэффициенты достаточные условия однозначной разрешимости задачи

$$\frac{dX}{dt} = \lambda A(t)X (K_0 + \lambda K_1(t)) + \lambda^2 B(t)XC(t) + F_0(t) + \lambda F_1(t), \quad (1)$$

$$X(0, \lambda) = X(\omega, \lambda), \quad X \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad (2)$$

где  $A(t), B(t), C(t), K_1(t), F_i(t)$  ( $i = 0, 1$ ) — вещественные непрерывные матрицы соответствующих размеров,  $K_0$  — постоянная матрица;  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $\omega > 0$ .

Данная работа является продолжением и развитием [1].

Примем следующие обозначения:

$$\tilde{A}(\omega) = \int_0^\omega A(\tau) d\tau, \quad \gamma = \|\tilde{A}^{-1}(\omega)\|, \quad \varepsilon = |\lambda|, \quad \alpha = \max_t \|A(t)\|, \quad \beta = \max_t \|B(t)\|,$$

$$\mu = \max_t \|C(t)\|, \quad \beta_0 = \|K_0\|, \quad \beta_1 = \max_t \|K_1(t)\|, \quad r = \|K_0^{-1}\|,$$

$$q_1 = \frac{1}{2}\gamma\alpha^2\beta_0\omega^2 + \gamma(\alpha\beta_1 + \beta\mu)r\omega, \quad q_2 = \frac{1}{2}\gamma\alpha\omega^2(\alpha\beta_1 + \beta\mu), \quad q = \varepsilon q_1 + \varepsilon^2 q_2,$$

где  $t \in [0, \omega]$ ,  $\|\cdot\|$  — согласованная норма матриц.

**Теорема.** Пусть выполнены условия:  $\det K_0 \tilde{A}(\omega) \neq 0$ ,  $0 < q(\varepsilon) < 1$ . Тогда задача (1), (2) однозначно разрешима. Ее решение  $X(t, \lambda)$  представимо в виде

$$X(t, \lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^{k-1} X_{k-1}(t), \quad (3)$$

где матрицы  $X_{k-1}(t)$  определены рекуррентным интегральным соотношением типа [1, 2].

Изучены вопросы сходимости, скорости сходимости ряда (3).

## Литература

1. Данилович Л. А., Лаптинский В. Н. *О периодической краевой задаче для обобщенного уравнения Ляпунова с параметром* // XV Междунар. науч. конф. по дифференциальным уравнениям «Еругинские чтения–2013»: тез. докл. Междунар. науч. конф. Ч. 1. 2013. С. 51–52.

2. Лаптинский В. Н. *Конструктивный анализ управляемых колебательных систем*. Мн.: Ин-т математики НАН Беларуси, 1998.